

ALLOGREFFE DE CELLULES SOUCHES HÉMATOPOÏÉTIQUES CHEZ L'ADULTE ATTEINT DE LEUCÉMIE AIGÜE : EXPÉRIENCE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE CHEIKH KHALIFA.

M. El Mousadik¹, D. Bensalla¹, I. Mourabiti¹, Z. Saad¹, H. Hadri¹, N. Bouanani¹, R. Tissir¹, S. Bencheekroun¹, M. Bendari¹

1. Service d'hématologie, Hôpital Universitaire International Cheikh Khalifa,
Université Mohammed VI des Sciences de la Santé (UM6SS), Casablanca, Maroc

INTRODUCTION

Les leucémies aiguës représentent un groupe hétérogène d'hémopathies malignes, caractérisées par une prolifération clonale de blastes hématopoïétiques responsable d'une insuffisance médullaire. Leur classification selon l'OMS repose sur des critères morphologiques, immunophénotypiques et moléculaires, essentiels à la stratification pronostique. Chez l'adulte, la leucémie aiguë myéloïde (LAM) prédomine (3-5 cas/100 000 habitants/an), tandis que la leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) est plus rare. L'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques constitue un traitement clé des formes à haut risque, mais son accès reste limité au Maroc ; dans ce contexte, cette étude rapporte l'expérience de notre centre dans l'allogreffe des leucémies aiguës.

OBJECTIF


Décrire les caractéristiques cliniques, biologiques, thérapeutiques et évolutives des patients adultes atteints de leucémie aiguë ayant bénéficié d'une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques dans notre centre.

MATÉRIEL ET MÉTHODES


Il s'agit d'une étude rétrospective descriptive menée au service d'hématologie de l'Hôpital Universitaire International Cheikh Khalifa, entre janvier 2023 et décembre 2025. Ont été inclus les patients adultes (≥ 18 ans) atteints de leucémie aiguë ayant bénéficié d'une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques. Les données, recueillies à partir des dossiers médicaux, ont porté sur les caractéristiques des patients, les modalités de la greffe et l'évolution, incluant la prise de greffe et les complications. L'anonymat et la confidentialité des patients ont été respectés.

RÉSULTATS (N = 11)


A. CARACTÉRISTIQUES DES PATIENTS




B. DONNÉES DE LA GREFFE




C. PRISE DE GREFFE ET PARAMÈTRES BIOLOGIQUES



D. COMPLICATIONS



E. CHIMÉRISME COMPLET À J30 (N = 11)



F. CAUSES DE DÉCÈS (N = 4)



G. DURÉE MÉDIANE DE SURVIE (N = 8)

Moyenne $\pm$ ET : 11,3 $\pm$ 10,6 mois
Médiane : 9 mois
Min - Max : 1 - 27 mois

CONCLUSION

L'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques constitue un traitement majeur des leucémies aiguës. Dans notre série, les résultats sont globalement satisfaisants, avec des complications maîtrisées malgré une toxicité non négligeable. Malgré le faible effectif, ces données confirment la faisabilité de cette approche dans notre contexte. Des études à plus grande échelle restent nécessaires pour optimiser la prise en charge au Maroc.