

Myeloproliferative Neoplasm Symptom Assessment Form (MPN-SAF) dans les SMP Phi-: A propos de 31 cas

L.ADIME 1 N.BENLACHGAR 2 C.KROUMBI 3 Z.TAZI

Introduction :

Les manifestations cliniques des SMP Phi - sont présentes chez la majorité des patients et impactent considérablement leur qualité de vie. Le suivi de leur évolution nous permet d'évaluer la réponse thérapeutique. Le MPN-SAF est un score développé à partir du MF-SAF validé pour la myélofibrose primitive, auquel ont été ajoutés 7 autres facteurs afin d'en faire un score d'évaluation commun aux trois SMP Phi- le rendant utile dans l'évaluation des symptômes dans les essais cliniques internationaux.

Objectifs:

L'objectif de notre étude était de vérifier la faisabilité et pertinence du MPN-SAF chez nos patients.

Matériels et méthodes:

Nous avons réalisé au services d'hématologie clinique adulte de l'hôpital moulay abdallah d'oncologie de Rabat une étude prospective monocentrique, incluant 31 patients atteints de SMP Phi- (15 PV, 6 TE, 10 MF). Le questionnaire a été traduit à la langue française pour les patients francophones et au dialecte marocain pour ceux qui ne le sont pas.

Résultats:

Caracteristiques des patients	
Age moyen	59ans (de 29- 89 ans)
sexe ratio	18F/13H
Durée moyenne d'évolution	42 mois
	-PV 41mois
	-TE 43 mois
	-MF 39 mois
Traitements reçus	-Hydroxyurée: 71%
	-Jak2 inhibiteurs:16%
Score MPN-SAF moyen	30.64 (107-0)

Figure 1 : caractéristique des patients inclus dans l'étude




Figure 2 : Score MPN-SAF en fonction des SMP Phi+




Figure 3 : Fréquences des symptômes chez nos patients selon le score MPN-SAF




Figure 4 : Prévalence des symptômes en fonction du SMP Phi+ sous jacent

Conclusion :

Le MPN-SAF a suscité une grande satisfaction chez les patients en relevant la majorité de leurs symptômes. Nos résultats concordent avec ceux des études à plus grande échelle nous encourageant ainsi à intégrer le MPN-SAF en pratique courante afin d'optimiser le suivi des patients et guider les décisions thérapeutiques, notamment dans l'évaluation de la réponse symptomatique aux traitements ciblés.