

INTRODUCTION :





Le lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) est le sous-type le plus fréquent des lymphomes non hodgkiniens, représentant environ 40 % des cas. Le traitement standard repose sur une immunochimiothérapie de type R-CHOP 21. Cependant, 20 à 30 % des patients rechutent et 10 à 15 % sont réfractaires au traitement de première ligne. Ces situations sont associées à un pronostic défavorable.

PATIENTS ET MÉTHODES :


Description de l'étude	
Etude	étude rétrospective, descriptive et monocentrique
service	Service hematologie et oncologie pediatrique
periode	période de 9 ans (janvier 2016 – décembre 2024).
Criters d'inclusion	tous les patients atteints de LDGCB réfractaire au traitement de première ligne ou en rechute.

RÉSULTATS :

caracteristique des patent	
Caractéristiques	Résultats
Période d'inclusion	Janvier 2016 – Décembre 2024 (9 ans)
Nombre total de patients atteints de LDGCB colligés	468
Patients avec maladie réfractaire ou en rechute	96 (20,5 %)
Sexe	- Hommes : 57 - Femmes : 39 - Sex-ratio (H/F) : 1,46
Âge	Médian : 46 ans (19–73 ans)



En deuxième ligne, le protocole le plus utilisé était le R-DHAP.



CONCLUSION-DISCUSSION :

Les formes réfractaires et les rechutes du LDGCB restent associées à un pronostic défavorable dans notre série. La majorité des patients présente des stades avancés et des scores pronostiques élevés, avec des options thérapeutiques limitées.